




愛媛県医師会員 （医療機関管理者） の喫煙問題意識調査

愛媛県医師会禁煙推進委員会

加藤正隆、大橋勝英、宮下哲一
土居康展、今村陽一、新野正治



目的

- 愛媛県医師会員の喫煙問題に対する認識を正確に把握する
- 今後の当委員会の活動方針を明確にする



方法

- 2005年9月
- 愛媛県医師会員（医療機関管理者）1235名全員を対象
- 調査協力依頼と調査票を送付
- 回答率を高めるために未提出者に対して再度依頼
- 83.5%の高い有効回答を得た



性別喫煙率


■ **男性喫煙率 15.4%**

日医（2004年）21.5%より6.1%低かった


女性喫煙率 8.3%

日医（2004年）5.4%より高かった

年齡別喫煙率



郡市医師会別喫煙率




郡市医師会別喫煙率 (低い医師会)


医師会	喫煙率%	回答率%
新居浜	4.2	93.9
宇摩	4.3	79.3
西条	5.4	80.4
南宇和	6.7	68.2

医療機関の望ましい喫煙対策と 実際の状況


自院の喫煙状況




望ましい喫煙対策




健康増進法第25条 認知度



医師のとるべき態度





患者の喫煙に対する考え方





禁煙診療の実際



初診時の問診





再診時の問診



カルテ記載





禁煙指導





禁煙診療の内容



ニコチン貼付剤





呼気CO測定




コチニン測定




カウンセリング




実施されるべきタバコ規制





考察

- 郡市医師会別喫煙率の差は禁煙推進への取組みの積極性の差。
喫煙率の高い医師会のリーダー的人材への委員就任とタバコ情報提供が必要。
- 施行後 2 年経過したにもかかわらず認知度の低い健康増進法の周知徹底に努めるべき。



考 察

- まず医療者側が喫煙は「病気」と理解し、患者を把握し、説得力・効果が大い診療を提供することが不可欠。
- 県医禁煙推進委員会は連盟支部・禁煙推進の会えひめなどの団体と協力して、医療関係者への情報提供や研修実施に努める。
- 禁煙医師連盟・禁煙学会の役割は重要。タバコ・タバコ産業撲滅のために一致団結を！